ПРОПОНИТ

Расширение регистрации

ПРОПОНИТ – гербицид

пропизохлор, 720 г/л

ПРОПОНИТ - надежная основа для творчества агронома

Селективный почвенный гербицид для борьбы с различными видами однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков в ряде культур

Расширение регистрации

ПРОПОНИТ - описание препарата

- Действующее вещество: пропизохлор, 720 г/л
- Химический класс: хлорацетамиды
- Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
- Упаковка: канистра 20 л
- Срок хранения: 3 года при температуре от -5°С до +35°С

ПРОПОНИТ - регламент применения

Культура	Норма применения, л/га	Способ, время обработки, особенности применения	Вредный объект
Подсолнечник, Рапс яровой и озимый	2,0 - 3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки
Кукуруза	2,0 - 3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
	2,5 - 3,0	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2-х до 3-х листьев кукурузы и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
Свекла сахарная, Рапс озимый	2,0 - 3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
	2,5 - 3,0	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 4 настоящих листьев культурных растений и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
Соя	2,0 - 3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
	3,0	Опрыскивание вегетирующих растений в фазу от 2 до 4 настоящих листьев сои и ранние фазы роста сорных растений в условиях орошения или при наличии достаточной влажности. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
Горох на зерно, Нут	2,0 – 3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
	2,5 – 3,0	Опрыскивание вегетирующих культурных растений в фазе 1-3 настоящих листьев и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
Картофель	2,0 – 3,0	Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
	2,5 – 3,0	Опрыскивание вегетирующих культурных растений при высоте ботвы 5 см и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Срок ожидания (кратность обработок): 60 (1)

ПРОПОНИТ - спектр действия

Высокочувствительные (эффективность 95%)	
Ежовник обыкновенный (куриное просо)	Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.
Мятлик однолетний	Poa annua L.
Росичка кроваво-красная	Digitaria sanguinalis (L.) Scop,
Щетинник мутовчатый	Setaria verticillata (L.) Beauv.
Щетинник сизый	Setaria glauca (L.) Beauv.
Чувствительные (эффективность 85-95%)	
Лисохвост мышехвостиковидный	Alopecurus myosoroides Huds.
Просо волосовидное	Panicum capillare L.
Просо сорное	Panicum miliaceum spp. ruderale (Kitag.)
Сорго алеппское, гумай (из семян)	Sorghum halepense (L.) Pers.
Щетинник зеленый	Setaria viridis
Овсюг	Avena fatua

ПРОПОНИТ - спектр действия

Средне чувствительные (эффективность 70-85%)	
Горец почечуйный	Polygonum persicaria L
Марь белая	*Chenopodium album L.*
Паслен черный	Solanum nigrum L.
Пастушья сумка обыкновенная	*Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.*
Подмаренник цепкий	*Galium aparine L.*
Ромашка, виды	Matricaria spp.
Щирица, виды	*Amaranthus spp.*
Средне устойчивые (эффективность 50-70%)	
Амброзия полыннолистная	Ambrosia artemisiifolia L.
Горец птичий	Polygonum aviculare L.
Дурнишник обыкновенный	Xanthium strumarium L.
Канатник Теофраста	Abutilon theophrasti Medik.
Лебеда раскидистая	A triplex patula L.
Редька полевая	Raphanus raphanistrum L.

ПРОПОНИТ - рекомендации

- Почва должна быть тщательно подготовленной, мелкокомковатой и влажной. Умеренные осадки и теплая погода непосредственно перед и после проведения опрыскивания повышают эффективность
- На полях с содержанием гумуса (>3%) следует применять максимальные нормы использования
- При содержании гумуса <1,5% применяют минимальные нормы препарата
- Проявляет наивысшую эффективность при оптимальном увлажнении почвы для роста и развития растений
- Норма расхода рабочего раствора 200-300 л/га

ПРОПОНИТ - на подсолнечнике

2 - 3 л/га

До всходов культуры



<u>При применении обязательно учитывать фазу развития сорняков:</u>

Злаковые сорняки – до 1 листа

Двудольные сорняки – до 2 листьев

ПРОПОНИТ - на кукурузе



<u>При применении обязательно учитывать фазу развития сорняков:</u>

Злаковые сорняки – до 1 листа

Двудольные сорняки – до 2 листьев

ПРОПОНИТ - на кукурузе

ПРОПОНИТ - на свекле сахарной

2 - 3 л/га

До всходов культуры
В фазу 2 - 4 настоящих листа



<u>При применении обязательно учитывать фазу развития сорняков:</u>

Злаковые сорняки – до 1 листа

Двудольные сорняки – до 2 листьев

ПРОПОНИТ - на свекле сахарной

- Возможность провести первую послевсходовую обработку позже – когда свекла будет менее чувствительна к действию гербицидов, как следствие снижение фитотоксичности

- После почвенной обработки сорные растения всходят одной волной, без «выскочек», как следствие нет необходимости использовать максимальную норму

- В ряде случаев, возможность исключить одну граминицидную обработку

ПРОПОНИТ - на свекле сахарной

ПРОПОНИТ - на сое



<u>При применении обязательно учитывать фазу развития сорняков:</u>

Злаковые сорняки – до 1 листа

Двудольные сорняки – до 2 листьев

<u>Для увеличения эффективности рекомендуется баковая смесь:</u>

Пропонит, КЭ – 2 л/га + Камелин, КЭ – 0,3 л/га

ПРОПОНИТ - на сое

Пропонит, КЭ - 2,0 л/га + Камелин, КЭ - 0,3 л/га
до всходов

Контроль

ПРОПОНИТ - на сое

ПРОПОНИТ – на горохе

Новинка

2 - 3 л/га

До всходов культуры
В фазу 1-3 листа

<u>При применении обязательно учитывать фазу развития сорняков:</u>

Злаковые сорняки – до 1 листа

Двудольные сорняки – до 2 листьев

ПРОПОНИТ – на нуте

Новинка

2 - 3 л/га

До всходов культуры
В фазу 1-3 листа



<u>При применении обязательно учитывать фазу развития сорняков:</u>

Злаковые сорняки – до 1 листа

Двудольные сорняки – до 2 листьев

ПРОПОНИТ – на картофеле

Новинка

2 - 3 л/га

До всходов
Высота ботвы 5 см

00 09 14 17 19 32 61 67 75 87

<u>При применении обязательно учитывать фазу развития сорняков:</u>

Злаковые сорняки – до 1 листа

Двудольные сорняки – до 2 листьев

ПРОПОНИТ – преимущества

1. Гибкость применения: после посева – ранняя фаза развития культуры
2. Эффективная защита с самого начала развития культуры
3. Широкая сфера применения по культурам и сорнякам
4. Длительное действие до 2-х месяцев
5. Безопасность для культуры и в севообороте
6. Расширенный список регистрации (нут, горох, картофель)

Каталог 2024

Заложи надежную основу
ПРОПОНИТ

ПРОПОНИТ

Каталог 2024

UPL

Начни путь к успеху с препаратами UPL

Телеграм