

ЛАЙФЛАЙН

Контактный гербицид
сплошного действия
для предуборочной десикации
широкого спектра
полевых культур

	Действующее вещество глюфосинат аммония, 280 г/л
	Класс HRAC группа 10 гербициды
	Формуляция водный раствор (BP)
	Упаковка канистра 10 л
	Срок годности 3 года

Культура	Норма расхода, л/га	Особенности применения препарата
Пшеница яровая	0,8–1,1	Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорных растений. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании — 100–200 л/га
Соя	0,8–1,3	Опрыскивание в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 30%), не менее чем за 10 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании — 200–300 л/га
Горох (на зерно)	0,5–1,1	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70–75% бобов 5–6 ярусов или при влажности семян 25–35%. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании — 200–300 л/га
Рапс яровой и озимый	0,8–1,3	Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70–75% стручков или влажности семян 25–35%. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га
Подсолнечник	0,8–1,1 0,8–1,1 (A)	Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70–80% побуревших корзинок (при 25–30% относительной влажности семян). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании — 200–300 л/га; 50–100 л/га — при авиаприменении
Картофель продовольственный (низкорослые сорта)	1,3–1,5	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га
Картофель продовольственный (высокорослые, сильно облиственные сорта)	1,3–1,5	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 7 дней. Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га

Назначение препарата — десикация

Сроки ожидания (кратность обработок) — 12(1)



ООО «ЮПЛ»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9
Т: +7 (495) 580 7775 Е: info.russia@upl-ltd.com

www.upl-ltd.ru



ЛАЙФЛАЙН

ДЕСИКАНТ




Препарат

КОНТАКТНЫЙ ГЕРБИЦИД СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕДУБОРОЧНОЙ ДЕСИКАЦИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

Глюфосинат аммония — 280 г/л | Водный раствор (BP)

- Высушивание культур за счет ускорения естественного процесса созревания.
- Не вызывает растрескивания бобов, стручков и осыпания семян.
- Обеспечивает равномерное созревание и улучшает качество семян.
- Повышает производительность уборки и снижает потери урожая.



ООО «ЮПЛ»

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.9
Т: +7 (495) 580 7775 Е: info.russia@upl-ltd.com

www.upl-ltd.ru



UPL_Russia



upl-ltd.ru

⚙️ Механизм действия

- Глюфосинат аммония блокирует фермент глютаминсинтетазу, вызывает накопление свободного аммиака в тканях.
- Быстрое угнетение фотосинтеза, нарушение мембранных функций и блокирование синтеза белка.
- Быстрое накопление свободного аммиака в растениях влечёт за собой «эффект старения».
- Препарат вызывает отток запасных жиров, белков и сахаров в семена.
- Максимальная эффективность при обработке в солнечный день.

🕒 Скорость воздействия


- Остановка роста происходит в первые сутки после обработки без видимых симптомов.
- Пожелтение листьев наблюдается в течение 2–3 дней, высыхание растений — в течение 2–3 недель.
- Уборка после десикации — через 10–14 дней.

Срок применения


Картофель



Подсолнечник



Соя




🔍 Особенности применения

- Важно полное смачивание; расход раствора — 200–400 л/га (полезны двухфакельные форсунки).
- Высокая относительная влажность воздуха (> 70%) способствует росту поглощения раствора листьями и увеличению эффективности.
- Оптимальная температура воздуха — 20–30 °С (при достаточной влажности); при температуре ниже 10 °С снижается эффективность.
- Вода не должна быть жёсткой (< 400 ppm (мг/литр) или < 8 мг-экв/л) с pH 5–7.
- Эффективность применения в солнечный день значительно выше, чем в тёмное время суток.
- Осадки через 4–6 часов после применения не снижают эффективность.


❓ В каких случаях целесообразно применять?

- При неблагоприятных погодных условиях.
- При поздних сроках посева или пересеве с уходом уборки в осень.
- При неравномерном созревании или развитии растений.
- При необходимости более раннего освобождения поля от предшественника.
- При распространении заболеваний (белой, серой гнили и др.).
- На семенных участках (сортовые и гибридные).
- Не рекомендуется использовать при выращивании семенного картофеля.

Рапс



Горех



Пшеница яровая

